



Edukasyon ng Pasyente

Mga Serbisyo sa Pagsasalarawan (Imaging Services)



Nabalam na Hindi Maiging Pakiramdam na Epekto ng IV

Mga pasunod na tuntunin

Ang papel na itong binibigay ay nagbibigay ng mga tuntunin na pasunod kung mayroon kang nabalam na hindi maiging pakiramdam na epekto pagkatapos na tumanggap ng contrast sa pamamagitan ng ugat habang sa pagsusuring pagsasalarawan.

Ano ang IV contrast?

Ang contrast ay isang tina na lumilitaw sa mga pagsusuring pagsasalarawan sa gaya ng mga CT scans, MRIs, o na mga kaparaanang angiography. Kapag nilalagyan ng contrast ang ugat, pinapaunlakan nito ang mga ugat, mga arterya, at ilan sa mga lamang-loob at mga istraktura sa inyong katawan na lumitaw nang mas maliwanag. Ang contrast na iniiniksiyon sa ugat ay tinatawag na IV contrast.

Ano ang aking gagawin pagkatapos ng pagsusuring IV contrast?

Pagkatapos na magkaroon ng iniksiyong contrast, uminom ng ekstrang mga likido upang tulungan ang iyong katawan na bombahin ang contrast mula sa iyong sistema. Uminom ng 2 o 3 ekstrang mga baso ng tubig sa loob ng 4 na oras ng pagkascan.

Mga Hindi Maiging Pakiramdam na Epekto ng Contrast

Mga hindi maiging pakiramdam na epekto sa IV contrast ay bihira, ngunit maaring mangyari ito. Maari itong ibat-iba mula sa mahinay (pagbabahin) hanggang sa nakakabanta sa buhay (anaphylaxis). Maaring kasama sa mga hindi maiging pakiramdam na epekto ang:

- Pagbabahin.
- Urtikarya (Hives) o pakiramdam na pangangati.
- Paninikip sa lalamunan, o kahirapang makahinga.

Maaring mangyari ang mga hindi maiging pakiramdam na epekto na ito pagkatapos na ang contrast ay nainiksiyon o mga ilang oras sa may bandang huli, kung minsan pagkatapos na nakaalis ka na sa klinika o senter ng pagamutan.

Paggagamot sa Mga Hindi Maiging Pakiramdam na Epekto ng IV Contrast

Napakahalaga ang paggamot sa mga hindi maiging pakiramdam na epekto. Ano mang senyas ng hindi maiging pakiramdam na epekto ay dapat na HINDI ipagwawalang bahala.

Mga Katanungan?

Tawagan ang 206-598-6200

Mahalaga ang inyong mga katanungan. Tawagan ang inyong doktor o tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan kung mayroon kang mga katanungan o mga pagkabahala. Mayroon ding mga tauhan ng klinikang UWMC na tutulong sa ano mang oras.

Mga Serbisyo sa Pagsasalarawan/
Radyolohiya (Imaging Services/Radiology):
206-598-6200

Lahat ng mga hindi maiging pakiramdam na epekto ay dapat na matasa ng isang propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan. Maari itong mangahulugan ng pagpunta sa pinakamalapit na Departamento ng Emerhensiya kung mangyari ang mga hindi maiging pakiramdam na epekto pagkatapos na nakaalis ka na sa klinika o senter ng pagamutan. Maaring bigyan ka ng gamot upang gamutin ang hindi mo maiging pakiramdam na epekto.

Ano ang aking gagawin kung sa aking palagay ako ay nagkakaroon ng hindi maiging pakiramdam na epekto, ngunit nakaalis na sa klinika o senter ng pagamutan?

Kung sa pakiramdam mo ay mayroon kang hindi maiging pakiramdam na epekto, nakaalis na sa klinika o senter ng pagamutan, at ang iyong mga sintomas ay mga:

- **Mahinay** (pangangati at/o pagbabahin):
 - Tawagan ang UWMC Radiology Department sa 206-598-6200 at humiling na makipag-usap sa radiologist.
 - Ipaliwanag na nagkaroon ka kamakailan lamang ng pagsusuring IV contrast at kung ano ang mga sintomas na mayroon ka. Bibigyan ka ng radiologist ng mga kasunurang alintuntunin.
- **Mas matindi** (kahirapang makahinga):
 - Magpunta kaagad sa pinakamalapit na Departamentong Emerhensiya.

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

Imaging Services

Box 357115
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200



Delayed Reaction to IV Contrast

Follow-up instructions

This handout provides instructions to follow if you have a delayed reaction after receiving contrast through a vein during an imaging study.

What is IV contrast?

Contrast is a dye that shows up on imaging studies such as CT scans, MRIs, or angiography procedures. When contrast is given into a vein, it allows veins, arteries, and some organs and structures in your body to show up more clearly. Contrast injected into a vein is called *IV contrast*.

What should I do after an IV contrast study?

After having an injection of contrast, drink extra fluids to help your body flush the contrast from your system. Drink 2 or 3 extra glasses of water within 4 hours of your scan.

Contrast Reactions

Reactions to IV contrast are rare, but they can happen. They can vary from mild (sneezing) to life-threatening (anaphylaxis). Reactions may include:

- Sneezing.
- Hives or an itchy feeling.
- Tightness in the throat, or difficulty breathing.

These reactions may occur right after the contrast is injected or several hours later, sometimes after you have left the clinic or medical center.

Treating an IV Contrast Reaction

Treating reactions is very important. Any sign of a reaction should NOT be ignored.

All reactions must be assessed by a health care professional. This may mean going to the nearest Emergency Department if the reaction develops after you have left the clinic or medical center. You may be given medicine to treat your reaction.

Questions?

Call 206-598-6200

Your questions are important. Call your doctor or health care provider if you have questions or concerns. UWMC clinic staff are also available to help at any time.

Imaging
Services/Radiology:
206-598-6200

What should I do if I think I am having a reaction, but have left the clinic or medical center?

If you feel you are having a reaction, have left the clinic or medical center, and your symptoms are:

- **Mild** (itchy and/or sneezing):
 - Call UWMC Radiology Department at 206-598-6200 and ask to speak with a radiologist.
 - Explain that you recently had an IV contrast study and what symptoms you are having. The radiologist will provide you with follow-up instructions.
- **More severe** (difficulty breathing):
 - Go to the nearest Emergency Department right away.

UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
UW Medicine

Imaging Services

Box 357115

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200